



Journal de la Clinique



Automne
2013

Horaires d'ouverture

Lundi-vendredi : 8h30-12h et 14h30-19h

Samedi : 8h30-12h et 14h30-18h

05 59 20 20 13

www.veterinaire-ocean.com



Cas insolites, conseils divers, info pratique... Rejoignez nous sur Facebook !

Traitement à la clinique : les allergies

Votre chien ou chat se gratte incessamment ? Ses symptômes s'améliorent lorsque vous lui administrez des corticoïdes mais reviennent dès que vous arrêtez les traitements ?

Nous pouvons vous proposer un **test intra-dermique pour le diagnostic des allergies chez le chien**. Ce test se fait à la clinique et nécessite une légère tranquillisation. Il consiste à raser un petit carré sur le côté du thorax et à injecter de toutes petites quantités d'allergènes dans la peau.



Si l'animal est allergique, une petite papule se forme au niveau du site d'injection de l'allergène en question. Vous avez ensuite la possibilité de mettre en place un traitement de désensibilisation afin de réduire plus durablement les symptômes de votre compagnon. N'hésitez pas à nous en parler !

La mutuelle animale

Votre animal, même jeune, n'est pas à l'abri d'une maladie ou d'un accident qui peut engendrer des frais imprévus et souvent importants. Une mutuelle qui rembourse vos soins vétérinaires vous permet de faire face à ces dépenses immédiatement. Demandez-nous conseil !

Les urgences chez le chien et le chat - 1^{ère} partie

Mon chien saigne, mon chat boîte... pas toujours facile de déterminer s'il faut consulter rapidement ou si au contraire, ça peut attendre ! Voici trois exemples de situations réellement urgentes auxquelles vous pourriez être confrontés.

L'accident de la voie publique et la défenestration

Les blessures peuvent aller de la simple entorse jusqu'à l'hémorragie interne ou la paralysie des membres. Malheureusement, les blessures les plus graves ne sont pas forcément les plus visibles. En effet, un chien peut se relever d'un choc avec une voiture, mais avoir les **organes abdominaux atteints** (rupture de la vessie p.ex.). Lors d'un choc, **évités au maximum de manipuler ou de déplacer votre animal**. Portez-le sur un drap qui fera office de civière. Essayez d'arrêter tout saignement visible en appuyant sur la plaie avec une compresse ou un linge propre. Consultez immédiatement dans tous les cas.



Les **défenestrations** sont fréquentes chez les chats en ville. Les blessures les plus rencontrées sont les fractures, mais aussi les hémorragies internes, les ruptures diaphragmatiques et les pneumothorax (de l'air autour du poumon, qui empêche le chat de respirer). Là aussi, il vaut mieux consulter, même si votre chat ne semble pas être blessé.

Le syndrome urologique félin

Le chat mâle peut, de par l'anatomie de ses voies urinaires, être victime d'une **obstruction de l'urètre** par un bouchon de **calculs, de cristaux, de mucus ou un caillot**. Il se retrouve alors dans l'impossibilité d'uriner, avec des conséquences souvent graves pour les reins.



De manière très caractéristique, il se met souvent en position pour uriner, sans y parvenir. Il est fréquent de voir des petites **gouttes d'urine teintées de sang** dans la litière ou même à travers l'habitation. Il est important de ne pas confondre ces symptômes avec ceux d'une constipation, car une **intervention précoce par le vétérinaire est impérative** (le jour même, n'attendez pas). Une sonde urinaire doit être placée sous anesthésie générale, afin de repousser le bouchon et de vidanger la vessie. Une alimentation de mauvaise qualité constitue une des causes principales, ainsi que la tendance du chat à boire peu de façon naturelle.

Les convulsions

Lors d'une crise convulsive, tous les muscles se contractent en même temps, l'animal perd connaissance et peut aussi vocaliser, saliver, uriner, déféquer. Généralement, les convulsions ne durent que **quelques secondes à quelques minutes**. L'animal se réveille ensuite, mais peut rester déboussolé quelques minutes à quelques heures avec des difficultés à reconnaître son entourage, se déplacer etc.



Que pouvez-vous faire en cas de crise convulsive ? Dans tous les cas, il est souhaitable de **ne pas stimuler votre compagnon**. Le secouer, l'appeler, bref le stimuler prolonge généralement la phase convulsive de la crise. **N'essayez pas d'attraper la langue !** Un animal ne peut pas l'avaler et vous risquez de vous faire mordre. Laissez votre animal au calme pendant et après la crise car il peut être agressif et peut ne pas vous reconnaître. La situation n'est dangereuse pour l'animal que si les crises se suivent de façon rapprochée ou si la crise dure trop longtemps (plus que quelques minutes), il est alors essentiel de voir un vétérinaire en urgence afin qu'il administre des anti-convulsifs en intraveineux.

L'arrivée d'un nouveau compagnon à la maison

Vous y avez réfléchi à deux fois, toute la famille est d'accord : vous voilà prêt à accueillir un chien ou un chat chez vous. Si c'est votre premier animal, ce petit pense-bête devrait vous aider à vous organiser pour ses soins de santé.



Les vaccins usuels	Généralement primo vaccin vers l'âge de 8 semaines et rappel à 12 semaines
Vaccination antirabique	Obligatoire pour quitter le territoire avec votre animal ; âge minimum : 12 semaines ; une seule injection suffit
Vermifugation	Minimum tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois, ensuite tous les 3 mois
Le traitement antipuce	Des produits antipuce efficaces existent, même pour les animaux très jeunes, n'hésitez pas à nous demander conseil !
L'examen vétérinaire	Se fait en général lors de la vaccination, votre animal sera examiné sous toutes ses coutures
Autres vaccins : leishmaniose, piroplasmose, borreliose	Si le mode de vie du chien le nécessite, après l'âge de 6 mois (ne peuvent pas être administrés avec les autres vaccins)
L'alimentation	Choisissez des croquettes de bonne qualité et laissez-nous vous guider dans votre choix.
Puberté / stérilisation	Possible dès 6 mois et même recommandée (mâle et femelle)

Les tumeurs mammaires chez le rat

Si le rat fut pendant très longtemps considéré comme un animal dangereux, craint par l'homme, il constitue aujourd'hui un animal de compagnie très apprécié. Le rat domestique est affectueux, très curieux, vif et intelligent et relativement simple à posséder et à entretenir chez soi.

Il est donc tout naturel qu'en tant que vétérinaires, nous soyons de plus en plus amenés à les soigner.

Parmi les fléaux les plus fréquemment rencontrés chez le rat nous avons choisi de parler brièvement des tumeurs mammaires. Pou-
 vant atteindre des tailles considérables, ces tumeurs sont hormono-dépendantes (leur croissance est stimulée par les hormones sexuelles). Elles sont souvent bénignes et le traitement de choix est l'exérèse chirurgicale,

qui donne de bons résultats. L'intervention est pratiquée sous anesthésie générale.

L'anesthésie de choix pour les rongeurs est l'anesthésie gazeuse à l'isoflurane, dont nous sommes bien sûr équipé dans nos deux cliniques. Les rechutes sont possibles, mais certains médicaments permettent de ralentir la réapparition de nouvelles tumeurs. N'hésitez donc pas à consulter si vous palpez une masse dans la région mammaire de votre rongeur et n'oubliez pas que cette affection peut aussi toucher les mâles.

Prévention : la stérilisation des rattes entre l'âge de 3 et 4 mois permettrait de réduire considérablement l'incidence des tumeurs mammaires dans cette espèce.



L'abcès de pied, que faire Docteur ?

Le scénario est classique : hier, votre cheval allait bien... mais aujourd'hui il se déplace sur trois membres, et ceci sans blessure apparente. Il y a de fortes chances que ce soit un abcès de pied.

L'abcès de pied expliqué

Un abcès se forme lorsque des bactéries pénètrent le sabot et se retrouvent enfermées à l'intérieur. Les germes passeraient via la ligne blanche élargie ou les trous des clous de fer.

Cela-dit, beaucoup d'abcès sont en réalité aseptiques. Ils se forment à partir de l'intérieur même du sabot, qu'il soit ferré ou non, lors de contractures et de mauvais parages.

Une partie du chorion du sabot, ce tissu hautement spécialisé et très vascularisé qui assure la suspension de la 3^{ème} phalange à l'intérieur de la boîte cornée, se retrouve coupé de la circulation sanguine et se nécrose (dégénère). Lors du retour de la circulation sanguine dans cette zone du chorion, le corps envoie des globules blancs à la nécrose pour l'évacuer. Un amas de pus se forme dans le sabot.

Or le sabot est construit comme une boîte fermée. Il n'y a donc pas de place pour ce pus, qui exerce une pression considérable, provoquant une douleur importante.

Le diagnostic

Le diagnostic est en général assez aisé. Un sabot chaud et surtout, une pulsation sanguine importante (palpable au niveau du creux du paturon) doivent vous alerter. Souvent, la boiterie est sévère et apparaît très brutalement.

Dans le doute, il est bien sûr toujours conseillé de faire appel à nos services rapidement, afin que nous puissions confirmer le diagnostic à l'aide d'une sonde de pied, localiser l'abcès et le traiter.



Traitement

Le traitement passe généralement par la création d'un trou dans le sabot, à condition que l'abcès soit suffisamment mûr. En attendant, il existe différentes méthodes pour ramollir la corne et faciliter par la suite le drainage du pus. N'hésitez pas à nous demander conseil.

Prévenir les abcès de pied

- Faites parer très régulièrement les pieds de votre cheval.
- Maintenez une hygiène irréprochable dans son box.
- Évitez de marcher sur du gravier ou protégez ses sabots s'ils sont fragiles
- Évitez les conditions extrêmes, que ce soit l'humidité ou la sécheresse.

